



城市园林化的小区布局

莫俊英

(广州市城市规划局)

近年来,以小区为生活单元的城市规划有了很大的发展。它比以街坊为单位,对于公共建筑配套、房屋布置和绿化布局,带来更大的优越性。然而在我国现阶段中,绿化设计和实施,仍未引起足够重视。不少住宅、房屋建成之后,长期未进行绿化;小区详细规划中建筑很少与绿化结合起来;基建计划中绿化投资也空缺。这方面对广州这个绿化条件优越的城市来说,不能不令人感到遗憾。我不是一个绿化工作者,但在业务接触过程中也碰到一些问题。仅整理于后,供讨论,修正。

小区绿化用地的比例,一般在百分之十左右,但实际空间比例——包括公共建筑绿化,宅前、宅后绿化和道路绿化,却占了百分之五十以上。因此,绿化在小区布局上,占有重要的地位。

一般来说:房屋的布置,周边式;有利于扩大绿化面积,空间比较集中;行列式:则绿化分布均匀,有利于分期建设;自由式:具有较大的灵活性。因此,如何做到与集中相结合;点、线、面结合;乔、灌木,花卉、石景等搭配适宜,将使小区布局多姿、多采,增添活泼的生活气息。

小区绿化布局,应根据自然地理条件,因地制宜进行。比如利用四周的绿化环境,包括:果林、水域、公园等以扩大绿地面积,小区绿化指标可适应降低。

旧城受房屋现况的局限,绿化建议采用灵活、多样的手法,不强求大面积实现。

在南方气候酷热的情况下,要设法提高绿化面积,减少地面辐射热(根据广州市的调查:在同一时间内,人民公园树下温度为

23℃,而起义路为28℃)。绿树成荫,有利于防风砂,使街景整齐,美观。

小区内的畸形地段,绿化是一种理想的空间处理手法和空间过渡办法。(照片1)



照片1 结合地形的小区绿化处理

对于一些污秽、丑陋的地段,如垃圾池、厕所、洞口……绿化起了掩蔽、装饰作用。


宅前、后的绿化,对居住环境安静有重要作用。以绿篱、灌木丛作空间分隔,比以砖、石、竹构筑成的围场整齐、经济而美观,防噪效果好。

为了扩大小区绿化效果,还可利用濠涌、湖滨、山坡的绿化,水土保持林和邻近的名胜、古迹绿化基础。这些地段有较大的绿化面积,幽静环境,供小区居民享受。(照片2)


利用室内、外、阳台、窗台的攀藤植物的绿化小品,可收到艺术效果。(照片3)

利用工厂、公共建筑地段、独院建筑中的庭园绿化与街坊绿化联系起来。

利用苗圃、花圃、防护林带、广场绿化



照片2 濠涌绿化



照片3 居民住宅前、院落、阳台绿化

联系起来。

这些方面的灵活运用，有助于扩大城市绿化效果，借景、对景是我国造园艺术的丰富遗产。我国一些大城市，如南京、郑州、南宁等市，不但有宽阔的干道绿带，而且发动群众把宅前、后绿化得很好。一些小区绿化从干道旁开始，建筑红线退缩了3—5米作绿带，既加强街坊绿化，又有利于居住环境安静。在城市园林化的过程中，必须实现城建“六统”，才能完整地、系统地实现小区绿化。

城市园林化是现代化城市的一个重要标志。不但要扩大绿化面积，更重要是提高艺术水平，即所谓空间概念，立体空间设计的艺术效果，房屋、绿化和空间的有机组合。怎样把我国优秀的造园传统运用到居住生活区的布局上来，有待我们绿化工作者的努力创造了。

(上接第19页)

病那样看待，在苯菌灵水溶剂，福尔马林、福美联水溶剂等药液中浸渍，进行消毒。

二、水仙叶斑病 (Stagonospora Curtisii) (BERKELEY) (SACCARDO)

〔被害与诊断〕 叶和花茎被侵害。开始，叶子呈现褐色斑点，不久便扩大成椭圆形，纺锤形，不正形病斑。病斑互相融合而竖向地成为又长又大的病斑。病斑的周围则褪为黄色。严重起来叶便枯死。即使花茎也与叶一样产生褐色的斑点。

〔生活与发生条件〕 这种病原菌，在

球茎上端的表皮或枯死的叶中，以菌丝或孢子的形态越冬，在球茎发芽时感染新叶。

〔防除法〕 望选用无病的种球。另外，在种植前必须按照处理郁金香球根腐病那样，不可忽视地对种球用药剂进行消毒。对于生长过程，从发芽期起便要定期地喷撒百菌清水溶剂600倍，敌菌丹水溶剂800倍，代森锰锌水溶剂600倍等，以防止蔓延。

节译自《花の病虫害》许惠浓 曾真垣