

浅谈莲花栽培

梁 比

我国栽培莲花的历史悠久，二千多年前即有关于它的记载。莲花是夏季的著名水生花卉之一，花繁叶茂，香气袭人，每当盛夏绿柳荷池的清新景色，吸引着多少游人、画家前往欣赏，故有夏赏绿荷池之称。古人称赞莲花出淤泥而不染，亭亭玉立，香远益清的美誉。我国民间除了在池塘栽培莲花之外，也普遍移栽庭院的小池或缸中，借以美化庭院和供业余欣赏。

莲花除作观赏外，也有多方面的实用价值，如荷叶饭，荷叶冬瓜粥和鲜莲子羹等夏令食谱；同时莲叶、莲藕、莲蓬和莲子等也是常用的中草药。

观赏用的莲花品种约有数十种，广州地区常见的有：千层宝珠红莲、千层白莲、粉红并蒂莲、五彩洒金莲、千层桌上莲和普通的白莲和红莲。

（上接第52页）

适于开花的日照时间则为12.5小时。

适于菊花花芽分化的温度是15℃左右，适于开花的温度为5—10℃以上。

广州地区栽培莲花，主要在旧历元月中旬至2月中旬（2—3月间）小心将莲藕从泥中取出，截取顶芽部分2—3节，埋植于事前准备好的泥盆中。泥最好选取鱼塘表层的油泥，每盆种植2—3条，藕芽要顺行走向不可相对，发芽后才不致生在一块而互相影响。待幼芽萌发之后才可逐渐增加盆中水分，一般保持5—10公分度。最初的几片叶子不能直立而浮在水面的叫浮水叶。这时可撒施2—5钱如黄豆大小的花生麸粒。叶子长出水面（立叶）两片以后，可在盆的四周插入泥中如姆子大小的花生麸片约一市两或其他等量的颗粒肥料作追肥，以后每月一次就可以了。注意观察盆水发臭及有孑孓时换上清水，并注意防风，避免吹折花叶。

莲花的花期5—8月，重瓣花多不结子，有的品种花后很快结莲藕，如在立秋前（7月底—8月初）挖藕重新种植，到重阳前后（10月中旬）可以第2次开花，叫“秋莲”。千层桌上莲常以此法栽培。不过秋植对藕种的养料消耗过多，影响来生势较大。

秋后随着气温的降低，莲花的生长逐渐放慢而至完全停止。这时不宜施肥，盆中水亦不宜过深，如遇霜冻，要排除盆中积水并加以复盖防寒，避免种藕遭受冻害。



电照期间晚间温度控制在10°~15℃，白天20—25℃，过高花芽分化快。

电照期间因停电中断电照，不宜连续超过2~3天，否则花芽会发生分化。